

Variété : ANNABELLE

Variété précoce, de type consommation à chair ferme, aux tubercules allongés et réguliers, à peau jaune et chair jaune foncé. Belle bonde clair, elle vous ravira en cuisine. Une vraie Miss à savourer sans retenue. Idéale en salade, vapeur, mitonnée ou rissolée.



Caractères descriptifs, culturels et culinaires

Catégorie : Consommation à chair ferme
Maturité : PRÉCOCE (Culture 80 à 110 jours)

IDEALE POUR :
SALADE, VAPEUR, MITONNEE, RISSOLEE

TUBERCULE

Allongé, peau jaune et chair jaune, yeux superficiels à très superficiels.

PLANTE

Feuillage vert clair, floraison nulle, fleur blanche.

QUALITE

Tenue à la cuisson : Très bonne
Noircissement après cuisson : Nul
Aptitude à la conservation : Moyenne
Teneur en matière sèche : 18,60%

RENDEMENT

137% de BELLE DE FONTENAY

CALIBRAGE

Proportion de
gros tubercules : Assez faible

SENSIBILITE AUX MALADIES

Mildiou du feuillage : Sensible
Mildiou du tubercule : Sensible
Virus Y : Assez peu sensible
Virus à l'enroulement : Assez peu sensible
Gale commune : Assez sensible
Nématode RO1-4 : Résistante

DEFAUTS DE TUBERCULE

Tâche de rouille : Peu sensible
Cœur creux : Peu sensible
Noircissement interne (tâches cendrées) : Peu sensible
Endommagements externes (type fractures) : Moyennement sensible

SENSIBILITE A L'EGERMAGE

Peu sensible

REPOS VEGETATIF

Moyen

DENSITE DE PLANTATION

| Calibre | Pieds / Ha | Nbre de tubercules / Kg* |
|---------|------------|--------------------------|
| 28/32 | 55 000 | 35,7 |
| 32/40 | 50 000 | 19,7 |
| 40/45 | 45 000 | 12,6 |
| 45/50 | 38 000 | 9,4 |

* le nombre de tubercules est indicatif et peut varier d'un lot à l'autre.

BESOINS GENERAUX

AZOTE : 200 Kg N/ha (+10% en 28/32)
y compris les fournitures du sol

INSECTICIDES :

Choisir des insecticides type contact et ingestion avec alternance des familles chimiques. Privilégier la lutte préventive.

IRRIGATION :

Débuter l'arrosage au stade d'initiation des tubercules pour diminuer le risque de gale commune. Ensuite arroser assidûment et aussi souvent que possible afin d'accroître le rendement. Stopper l'arrosage assez longtemps à l'avance pour ne pas avoir de lenticelles ouvertes au moment du défanage.

MILDIU :

Démarrer les traitements tôt de façon à obtenir une protection constante. Respecter les dosages en alternant les matières actives pour éviter les résistances. Prendre des produits peu ou pas lavables en cycle d'arrosage continu.

DÉFANAGE :

Avant le défanage, vérifier que les lenticelles soient bien fermées. Respecter les doses conseillées.

ARRACHAGE :

Faire très attention au moment de l'arrachage de façon à éviter les endommagements mécaniques.

SÉCURITÉ :

Respecter les délais de rémanence de tous produits appliqués avant la commercialisation.