

Variété : DITTA

Variété demi-tardive, de type consommation à chair ferme, aux tubercules oblongs allongés et réguliers, à peau jaune et chair jaune. Un jaune soutenu, une chair très ferme pour cette variété de bonne conservation et de forme régulière.



Caractères descriptifs, cultureux et culinaires

Catégorie : Consommation à chair ferme
Maturité : DEMI-TARDIVE (Culture 90 à 120 jours)

IDEALE POUR :
SALADE, VAPEUR, MITONNÉE, RISSOLÉE

TUBERCULE

Oblong allongé, peau jaune et chair jaune, yeux superficiels à très superficiels.

PLANTE

Feuillage vert franc, floraison moyennement abondante, fleur blanche.

QUALITE

Tenue à la cuisson : Très bonne
Noircissement après cuisson : Nul
Aptitude à la conservation : Assez bonne
Teneur en matière sèche : 19,60%

RENDEMENT

98% de BINTJE

CALIBRAGE

Proportion de
gros tubercules : Forte

SENSIBILITE AUX MALADIES

Mildiou du feuillage : Moyennement sensible
Mildiou du tubercule : Peu sensible
Virus Y : Assez sensible
Virus à l'enroulement : Assez sensible
Gale commune : Assez peu sensible
Nématode RO1-4 : Résistante

DEFAUTS DE TUBERCULE

Tâche de rouille : Peu sensible
Cœur creux : Peu sensible
Noircissement interne
(tâches cendrées) : Assez peu sensible
Endommagements externes
(type fractures) : Assez peu sensible
Sensibilité aux chocs : Assez peu sensible

SENSIBILITE A L'EGERMAGE

Moyennement sensible

REPOS VEGETATIF

Très long

DENSITE DE PLANTATION

Calibre	Pieds / Ha	Nbre de tubercules / Kg*
28/35	48 000 à 50 000	38
35/45	42 000 à 44 000	17,5
45/50	36 000 à 38 000	10,5

* le nombre de tubercules est indicatif et peut varier d'un lot à l'autre.

INSECTICIDES :

Choisir des insecticides type contact et ingestion avec alternance des familles chimiques. Privilégier la lutte préventive.

IRRIGATION :

Débuter l'arrosage au stade d'initiation des tubercules pour diminuer le risque de gale commune. Ensuite arroser assidûment et aussi souvent que possible afin d'accroître le rendement. Stopper l'arrosage assez longtemps à l'avance pour ne pas avoir de lenticelles ouvertes au moment du défanage.

MILDIU :

Démarrer les traitements tôt de façon à obtenir une protection constante. Respecter les dosages en alternant les matières actives pour éviter les résistances. Prendre des produits peu ou pas lavables en cycle d'arrosage continu.

DÉFANAGE :

Avant le défanage, vérifier que les lenticelles soient bien fermées. Respecter les doses conseillées.

ARRACHAGE :

Faire très attention au moment de l'arrachage de façon à éviter les endommagements mécaniques.

SÉCURITÉ :

Respecter les délais de rémanence de tous produits appliqués avant la commercialisation.