


Variété : GOURMANDINE

Variété demi-tardive, de type consommation à chair ferme, aux tubercules oblongs allongés et réguliers, à peau jaune et chair jaune. Capable de jouer dans la cour des grandes, cette chair ferme de très bonne tenue amène toute sa précocité au jardin. Capricieuse côté germination, elle doit être bien surveillée lors de la mise en terre.



Caractères descriptifs, culturaux et culinaires

Catégorie : Consommation à chair ferme
Maturité : DEMI-TARDIVE (Culture 90 à 120 jours)

IDEALE POUR :
SALADE, VAPEUR, MITONNEE, RISSOLEE

TUBERCULE

Oblong allongé, peau jaune et chair jaune, yeux superficiels à très superficiels.

PLANTE

Feuillage vert moyen à foncé, floraison moyennement abondante, fleur rouge violacé.

QUALITE

Tenue à la cuisson : Très bonne
Noircissement après cuisson : Nul
Aptitude à la conservation : Assez bonne
Teneur en matière sèche : 19,20%

RENDEMENT

102% de BINTJE

CALIBRAGE

Proportion de
gros tubercules : Faible

SENSIBILITE AUX MALADIES

Mildiou du feuillage : Assez sensible
Mildiou du tubercule : Sensible
Virus Y : Moyennement sensible
Virus à l'enroulement : Assez peu sensible
Gale commune : Assez sensible
Nématode RO1-4 : Sensible

DEFAUTS DE TUBERCULE

Tâche de rouille : Moyennement sensible
Cœur creux : Moyennement sensible
Noircissement interne (tâches cendrées) : Peu sensible
Endommagements externes (type fractures) : Assez sensible
Sensibilité aux chocs : Assez sensible

SENSIBILITE A L'EGERMAGE

Très sensible

REPOS VEGETATIF

Moyen

DENSITE DE PLANTATION

Calibre	Pieds / Ha	Nbre de tubercules / Kg*
32/35	58 à 60 000	27
35/45	46 à 48 000	17
45/50	42 à 44 000	10

* Le nombre de tubercules est indicatif et peut varier d'un lot à l'autre.

INSECTICIDES :

Choisir des insecticides type contact et ingestion avec alternance des familles chimiques. Privilégier la lutte préventive.

IRRIGATION :

Débuter l'arrosage au stade d'initiation des tubercules pour diminuer le risque de gale commune. Ensuite arroser assidûment et aussi souvent que possible afin d'accroître le rendement. Stopper l'arrosage assez longtemps à l'avance pour ne pas avoir de lenticelles ouvertes au moment du défanage.

MILDIOU :

Démarrer les traitements tôt de façon à obtenir une protection constante. Respecter les dosages en alternant les matières actives pour éviter les résistances. Prendre des produits peu ou pas lavables en cycle d'arrosage continu.

DÉFANAGE :

Avant le défanage, vérifier que les lenticelles soient bien fermées. Respecter les doses conseillées.

ARRACHAGE :

Faire très attention au moment de l'arrachage de façon à éviter les endommagements mécaniques.

SÉCURITÉ :

Respecter les délais de rémanence de tous produits appliqués avant la commercialisation.