


## Variété : ROSEVAL

*Variété demi-tardive, de type consommation à chair ferme, aux tubercules claviformes et réguliers à très réguliers, peau rouge et chair jaune. C'est la seule vraie chair ferme rouge. Ses qualités culinaires sont incontestées. Sa chair est parfois veinée de rouge.*



### Caractères descriptifs, cultureux et culinaires

Catégorie : Consommation à chair ferme  
Maturité : DEMI-TARDIVE (Culture 90 à 120 jours)

**IDEALE POUR :**  
SALADE, VAPEUR, MITONNEE, RISSOLEE

#### TUBERCULE

Claviforme, peau rouge et chair jaune, yeux superficiels à très superficiels.

#### PLANTE

Feuillage vert clair, floraison abondante, fleur rouge violacé.

#### QUALITE

Tenue à la cuisson : Bonne  
Noircissement après cuisson : Nul  
Aptitude à la conservation : Assez bonne  
Teneur en matière sèche : 21,70%

#### RENDEMENT

96% de BINTJE

#### CALIBRAGE

Proportion de  
gros tubercules : Moyenne

#### SENSIBILITE AUX MALADIES

Mildiou du feuillage : Sensible  
Mildiou du tubercule : Sensible  
Virus Y : Sensible  
Virus à l'enroulement : Sensible  
Gale commune : Assez peu sensible  
Nématode RO1-4 : Sensible

#### DEFAUTS DE TUBERCULE

Tâche de rouille : Peu à très peu sensible  
Cœur creux : Peu sensible

#### SENSIBILITE A L'EGERMAGE

Assez peu sensible

#### REPOS VEGETATIF

Moyen

## **INSECTICIDES :**

Choisir des insecticides type contact et ingestion avec alternance des familles chimiques. Privilégier la lutte préventive.

## **IRRIGATION :**

Débuter l'arrosage au stade d'initiation des tubercules pour diminuer le risque de gale commune. Ensuite arroser assidûment et aussi souvent que possible afin d'accroître le rendement. Stopper l'arrosage assez longtemps à l'avance pour ne pas avoir de lenticelles ouvertes au moment du défanage.

## **MILDIU :**

Démarrer les traitements tôt de façon à obtenir une protection constante. Respecter les dosages en alternant les matières actives pour éviter les résistances. Prendre des produits peu ou pas lavables en cycle d'arrosage continu.

## **DÉFANAGE :**

Avant le défanage, vérifier que les lenticelles soient bien fermées. Respecter les doses conseillées.

## **ARRACHAGE :**

Faire très attention au moment de l'arrachage de façon à éviter les endommagements mécaniques.

## **SÉCURITÉ :**

Respecter les délais de rémanence de tous produits appliqués avant la commercialisation.