

Variété : **TWINNER**

Variété précoce, de type consommation, aux tubercules oblongs et réguliers, à peau jaune et chair jaune.



Caractères descriptifs, culturaux et culinaires

Catégorie : Consommation
Maturité : Précoce (Culture 80 - 110 jours)

IDÉALE POUR :
FRITE, FOUR, PUREE, POTAGE

TUBERCULE
Oblong, peau jaune et chair jaune

PLANTE
Fleur blanche.

QUALITE
Tenue à la cuisson : Bonne
Noircissement après cuisson : Assez sensible
Aptitude à la conservation : Bonne
Teneur en matière sèche : 19,70%

RENDEMENT
Très bon

SENSIBILITE AUX MALADIES
Mildiou du feuillage : Peu à pas sensible
Mildiou du tubercule : Peu à pas sensible
Virus Y : Peu sensible
Gale commune : Sensible
Nématode RO1-4 : Pas sensible

DEFAUTS DE TUBERCULE
Coups bleu : Peu sensible
Crevasse : Peu sensible

REPOS VEGETATIF
Moyen

DENSITE DE PLANTATION

Calibre	Pieds / Ha
28/35	44 000
35/45	36 000
45/50	33 000

INSECTICIDES :

Choisir des insecticides type contact et ingestion avec alternance des familles chimiques. Privilégier la lutte préventive.

IRRIGATION :

Débuter l'arrosage au stade d'initiation des tubercules pour affaiblir le risque de gale commune. Ensuite arroser assidûment et aussi souvent que possible afin d'accroître le rendement. Stopper l'arrosage assez longtemps à l'avance pour ne pas avoir de lenticelles ouvertes pendant du défanage.

MILDIU :

Démarrer les traitements tôt de façon à obtenir une protection constante. Respecter les dosages en alternant les matières actives pour éviter les résistances. Prendre des produits peu ou pas lavables en cycle d'arrosage continu.

DÉFANAGE :

Avant le défanage, vérifier que les lenticelles soient bien fermées. Respecter les doses conseillées.

ARRACHAGE :

Faire très attention au moment de l'arrachage de façon à éviter les endommagements mécaniques.

SÉCURITÉ :

Respecter les délais de rémanence de tous produits appliqués avant la commercialisation.