

## Variété : **ROUSSEAU**

*Variété demi-précoce de type consommation à chair ferme, aux tubercules oblongs allongés à allongés et réguliers à très réguliers, peau rouge et chair jaune beurre.*



@A

## Caractères descriptifs, culturels et culinaires

Catégorie : Consommation à chair ferme  
Maturité : DEMI-PRÉCOCE (Culture 85 à 115 jours)

**IDEALE POUR :**  
SALADE, VAPEUR, MITONNEE, RISSOLEE

### TUBERCULE

Oblong allongé à allongé, peau rouge et chair jaune beurre, yeux superficiels à très superficiels.

### PLANTE

Feuillage vert moyen, floraison faiblement à moyennement abondante.

### QUALITE

Tenue à la cuisson : Très bonne  
Noircissement après cuisson : Nul  
Aptitude à la conservation : Bonne  
Teneur en matière sèche : 18,90%

### RENDEMENT

Bon

### CALIBRAGE

Proportion de  
gros tubercules : Assez faible

### SENSIBILITE AUX MALADIES

Mildiou du feuillage : Sensible  
Mildiou du tubercule : Sensible à très sensible  
Virus Y : Assez peu sensible  
Gale commune : Moyennement sensible  
Nématode RO1-4 : Résistante

### DEFAUTS DE TUBERCULE

Tâches de rouille : Peu sensible  
Noircissement interne  
(tâches cendrées) : Peu sensible  
Endommagements externes  
(type fractures) : Moyennement sensible

### SENSIBILITE A L'EGERMAGE

Moyennement sensible

### REPOS VEGETATIF

Assez court à moyen

## **INSECTICIDES :**

Choisir des insecticides type contact et ingestion avec alternance des familles chimiques. Privilégier la lutte préventive.

## **IRRIGATION :**

Débuter l'arrosage au stade d'initiation des tubercules pour diminuer le risque de gale commune. Ensuite arroser assidûment et aussi souvent que possible afin d'accroître le rendement. Stopper l'arrosage assez longtemps à l'avance pour ne pas avoir de lenticelles ouvertes au moment du défanage.

## **MILDIOU :**

Démarrer les traitements tôt de façon à obtenir une protection constante. Respecter les dosages en alternant les matières actives pour éviter les résistances. Prendre des produits peu ou pas lavables en cycle d'arrosage continu.

## **DÉFANAGE :**

Avant le défanage, vérifier que les lenticelles soient bien fermées. Respecter les doses conseillées.

## **ARRACHAGE :**

Faire très attention au moment de l'arrachage de façon à éviter les endommagements mécaniques.

## **SÉCURITÉ :**

Respecter les délais de rémanence de tous produits appliqués avant la commercialisation.



Agrico



